



VERSA®

FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cazante®


CAZANTE® (Metoxifenocida)

RSCO-INAC-0164-X1036-064-23.08

Formulación: Suspensión concentrada

Fórmula Estructural:

METOXIFENOCIDA



Información general:

Diacilhidracina con actividad insecticida. Actúa principalmente por ingestión y en algunos casos por contacto; con actividad sistémica en las raíces. No posee propiedades traslaminarias ni sistémicas por el floema. Específico contra orugas y huevos de Lepidópteros. Se enlaza con la proteína receptora de la ecdisona de las orugas y ocasiona el cese de la alimentación e induce una prematura muda que es mortal. Es una forma de actuar similar a las del tebufenocida y halofenocida pero no a las de las hormonas juveniles y de las benzilfenilureas con las que no cesan de alimentarse los insectos. En el suelo se fotoliza con una vida media de 173 días. En el campo se degrada con una vida media de 23 a 268 días.

No. CAS: 161050-58-4



VERSA®

FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.

Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170

Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160

Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila

Tel. 01 (871) 705 40 00

Composición porcentual:

METOXIFENOCIDA:

N-tert-butil-N'-(3-metoxi- o-toluoil)-3,5-xilohidracida	23.08%
(Equivalente a 240 g de I.A./L a 20°C)	
Dispersante, humectante, anticongelante, antiespumante, adherente, espesante, conservador y diluyente	76.92%

Campo de actividad:

A las dosis adecuadas resulta efectivo en el control de: agusanado de las manzanas y peras (*Cydia pomonella*), capua de los frutales (*Adoxophyes orana*), gardama (*Spodoptera exigua*), minador de las hojas de los cítricos (*Phyllocnistis citrella*), minador punteado de las hojas del peral (*Phyllonorycter blancardella*), minadora de los brotes del melocotonero (*Anarsia lineatella*), oruga medidora del tomate (*Chrysodeixis chalcites*), pandemis del peral y del manzano (*Pandemis heparana*), polilla del racimo (*Lobesia botrana*), polilla del racimo (*Eupoecilia ambiguella*), polilla oriental del melocotonero (*Grapholita molesta*) y rosquilla negra (*Spodoptera littoralis*) y otros Lepidópteros en cultivos de lechuga, mandarino, manzano, melocotonero, naranjo, nectarino, peral, pimienta, tomate y vid.

Propiedades de CAZANTE®:

Apariencia: Líquido viscoso color blanco

Densidad: 1.029 – 1.049 g/mL

pH: 6.5 a 7.5

Espuma persistente: Máximo 20.0 mL después de 1 minuto.

Solubilidad en agua: 3.3 mg/L a 20°C (I.A. IUPAC)

Punto de fusión: 185°C (I.A. IUPAC)



VERSA®

FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivos	Plagas	Dosis mL/ha	Observaciones
Nogal pecanero (30)	Gusano barrenador de la nuez <i>Acrobasis nuxvorella</i>	30 - 40 mL/100 L de agua	Realizar 2 aplicaciones foliares, con un intervalo de 14 días entre cada una. La primera aplicación realizarla en base al trapeo de palomillas: 1 a 3 palomillas capturadas/trampa/día. Se recomienda emplear un volumen de agua de 1000 L/ha, previo ajuste.
	Gusano Barrenador del Ruezno <i>Cydia Caryana</i>	30-40 mL/ 100 L de agua	Preferentemente aplicar sobre estadios iniciales, cuando la etapa fenológica del cultivo y la inspección de trampas de adultos indique que se ha alcanzado la etapa crítica de control.
Maíz (30)	Gusano Cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	125-170	Inicie la aplicación cuando la planta tenga aproximadamente 10 cm de altura y principalmente se encuentren larvas en estadios L1 y L2.
Algodonero (14)	Gusano Soldado <i>Spodoptera exigua</i>	125-210	Inicie las aplicaciones cuando en el muestreo detecte las primeras oviposiciones.
Col, Brócoli, Coliflor, Col de Bruselas (1)	Gusano Soldado <i>Spodoptera exigua</i>	250	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.
	Gusano falso medidor <i>Trichoplusia ni</i>		
	Palomilla dorso de diamante <i>Plutella xylostella</i>	333-500	Inicie las aplicaciones cuando se detecten las primeras oviposiciones o se encuentren larvas en los primeros instares con umbrales de presencia de 0.3 a 0.5 larvas por planta.
	Gusano corazón de la col <i>Copitarsia incommoda</i>	250	



VERSA[®]

FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivos	Plagas	Dosis mL/ha	Observaciones
Chile, Jitomate Tomate de cáscara, Berenjena (1)	Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	200-250	Inicie las aplicaciones cuando en el muestreo se detecten primeras oviposiciones o se encuentre larvas las en estadios L1 o L2.
Manzano, Peral (14)	Palomilla del manzano <i>Cydia Pomonella</i>	50-70 mL/ 100 L de agua	Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica al momento de la oviposición o eclosión de huevecillos justo antes de que ocurra la penetración de las larvas del primer instar en los frutos cuajados. Se recomienda realizar dos aplicaciones con intervalos de 14 a 21 días para lograr el mayor control de larvas emergidas, presentes durante los picos secundarios de la primera generación o vuelo de primavera. Utilice el rango de dosis de acuerdo al nivel de infestación en la Región.
Piña (25)	Barrenador del fruto <i>Thecla basilides</i>	300-400	Inicie la aplicación cuando la planta se encuentre en el inicio de la formación del fruto y de la floración, en la etapa de "cono rojo". Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días. Para asegurar un mejor control se recomienda agregar un coadyuvante a dosis de 0.5 mL/L de agua.



FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



VERSA[®]

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivos	Plagas	Dosis mL/ha	Observaciones
Pepino, Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Sandía (3)	Gusano barrenador <i>Diaphania hyalinata</i>	250 - 300	Realizar una aplicación cuando se detecten las primeras ovipositorias y presencia de larvas en las terminales. Volumen de aplicación: 430–530 L de agua/ha.
Aguacate (2)	Gusano falso medidor <i>Sabulodes aegrotata</i>	250 - 500	Hacer la aplicación del producto cuando se presente la plaga en las etapas iniciales. Utilizar el volumen de agua necesario para cubrir el follaje.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: después de 24 horas.

() Intervalos de seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Métodos para preparar y aplicar el producto:

Calibre el equipo de aplicación, en un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar el producto a la dosis recomendada en esta etiqueta y agitar, posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo y agregar la totalidad del agua calculada en la calibración. Mezcle las dosis de CAZANTE[®] en la cantidad necesaria de agua limpia para cubrir una hectárea. La aplicación debe ser dirigida y evitar que se desvíe la aspersión por arrastre de viento u otras causas. Asegúrese del perfecto cubrimiento del cultivo. Usar el volumen de agua adecuado por hectárea, acorde al tamaño y/o desarrollo del cultivo.



VERSA®

FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.

Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170

Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160

Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila

Tel. 01 (871) 705 40 00

Toxicología:

Categoría toxicológica: 5— Precaución — Puede ser nocivo en caso de ingestión / Puede ser nocivo si se inhala / Puede ser nocivo por el contacto con la piel

Presentaciones disponibles:

Envase de 1 L

Fecha de actualización: Marzo 2025

