



VERSA®

FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Versate®


VERSATE® (Bifenazato)

RSCO-INAC-0103U-X0932-417-50.0

Formulación: Polvo humectable

Fórmula Estructural:

BIFENAZATO



Información general:

Hidrazincarboxilatos. Éster del ácido carboxílico, no sistémico, con actividad acaricida principalmente por contacto y residual. Inhibidor del sistema nervioso. Tiene rápido efecto de choque y larga actividad residual. En los animales, la pequeña cantidad que pueda absorberse, se oxida al correspondiente nitro-compuesto y se hidroxila. En las plantas, al no ser sistémico, se queda sobre las superficies de hojas y frutos y no se metaboliza; las pequeñas cantidades que puedan penetrar se metabolizan como en los animales.

Su vida media en suelos aerobios es de 7.3 horas a 1 día y en suelos anaerobios de 78 días. Su vida media a la fotólisis en medio acuoso a pH 7 es de 0.7 días y a la hidrólisis a pH 7 y 20 °C de 0.8 días. Ni el i.a. ni sus metabolitos se lixivian ni son persistentes.

No. CAS: 149877-41-8



FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



VERSA®

Composición porcentual:

BIFENAZATO:

Isopropil 3-(4-metoxibifenil-3-il)carbazato (Equivalente a 500 g de I.A./Kg)	50.00%
Vehículo, dispersante y humectante	50.00%

Campo de actividad:

Muestra una gran actividad contra ácaros fitófagos de los géneros *Eutetranychus*, *Oligonychus*, *Panonychus*, *Tetranychus* y otros tetránquidos. Controla huevos y formas móviles, es decir, ejerce su actividad sobre los ácaros fitófagos en todos sus estados de desarrollo.

Propiedades de VERSATE®:

Apariencia: Polvo

Solubilidad en agua: 2.06 mg/L a 20 °C (I.A. IUPAC)

Punto de fusión: 122 °C (I.A. IUPAC)

Cultivos	Plagas	Dosis Kg/ha	Intervalo de seguridad (días)	Observaciones
Aguacate	Ácaro cristalino (<i>Oligonychus perseae</i>) Ácaro café (<i>Oligonychus punicae</i>)	0.75 – 1.0	7	Realizar una aplicación foliar al detectar los primeros individuos de la plaga, adicionar un coadyuvante no iónico a la dosis recomendada en su etiqueta.
Frambuesa Fresa Vid Zarzamora	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.75 – 1.0	1	Realizar una aplicación dirigida al follaje cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.
Berenjena Chile Jitomate Okra Pimiento morrón Tomate verde	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.75 – 1.0	3	Realizar una aplicación foliar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.



VERSA®

FICHA TÉCNICA INSECTICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivos	Plagas	Dosis Kg/ha	Intervalo de seguridad (días)	Observaciones
Calabacita Calabaza Chayote Melón Pepino Sandía	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.75 – 1.0	3	Realizar una aplicación foliar cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Adicionar el coadyuvante no iónico a dosis recomendada en su etiqueta.

Intervalo de seguridad en días, entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA: 12 horas después de la aplicación del producto.

Métodos para preparar y aplicar el producto:

Verifique que el envase se encuentra en buen estado. Calibre el equipo de aplicación, en un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar el producto a la dosis recomendada en esta etiqueta y agitar, posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo y agregar la totalidad del agua calculada en la calibración. Mezcle las dosis de **VERSATE®** en la cantidad necesaria de agua limpia para cubrir una hectárea. La aplicación debe ser dirigida y evitar que se desvíe la aspersión por arrastre de viento u otras causas. Asegúrese del perfecto cubrimiento del cultivo. Usar el volumen de agua adecuado por hectárea, acorde al tamaño y/o desarrollo del cultivo.

Toxicología:

Categoría toxicológica: 5– Precaución – Puede ser nocivo en caso de ingestión / Puede ser nocivo si se inhala / Puede ser nocivo por el contacto con la piel

Presentaciones disponibles:

Envase de 500 g

Fecha de actualización: Enero 2025

