



FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00


Celeste® 720 FW

CELESTE® 720 FW (Clorotalonil)

RSCO-FUNG-0309-468-008-054

Formulación: Suspensión acuosa

Fórmula Estructural:



Información general:

Ftalonilo, aromático polidorado derivado del ácido cloroisofáltico con actividad fungicida, de amplio espectro, de aplicación foliar, no sistémico, con limitada capacidad de traslocación local, actividad por contacto y acción preventiva y erradicativa sobre numerosas enfermedades de origen fúngico. Inhibe la respiración de las células del hongo, es decir, la transformación de los hidratos de carbono en energía porque las moléculas de clorotalonil se unen a grupos sulfhidrilos de algunos aminoácidos. Las enzimas que afectan al Ciclo de Krebs se desactivan y no se produce ATP (Adenosin trifosfato). Al no poder completar este proceso la célula muere. Se considera que el clorotalonil actúa como un fungitóxico no específico, de acción rápida, pertenece al grupo de inhibidores multisitio. Los síntomas generales de su acción sobre las células fúngicas son el retraso del crecimiento del micelio y la inhibición de la germinación de las esporas. El no ser específico explica, en gran parte, su amplio espectro de acción y la no aparición de resistencias genéticas. También posee efecto cicatrizante sobre las lesiones producidas por los patógenos sensibles observándose una piel más tersa y una recuperación rápida de los tejidos dañados. El clorotalonil presenta una vida media de 10 a 40 días en suelos aireados y de 5 a 15 días en suelos inundados. En los sistemas acuáticos este compuesto puede unirse a los sólidos suspendidos y sedimentos o puede ser eliminado por procesos químicos y biológicos. Su vida media por biodegradación varía entre 8.1 y 8.8 días en agua marina, su vida media por fotólisis es igual a 65 días en la superficie del agua y su vida media por hidrólisis tiene un valor de 38.1 días en aguas alcalinas (pH de 9). Es estable a la hidrólisis en condiciones ácidas o neutras. Su potencial de bioconcentración varía de bajo a alto en organismos acuáticos. Se considera poco persistente: 6-43 días.

No. CAS: 1897-45-6

Composición porcentual:

Clorotalonil:

Tetradoroisofaltonitrilo

54.00%

(Equivalente a 720 g de I.A./L a 20°C)

Dispersante, humectante, espesante y diluyente.

46.00%



FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Campo de actividad:

Entre las numerosas enfermedades fúngicas que controla destacan las producidas por: antracnosis (*Colletotrichum sp.*), antracnosis [pudrición amarga de algunos frutos] (*Glomerella cingulata*), antracnosis de la soya (*Colletotrichum dematium*), antracnosis de la soya (*Glomerella truncata*), antracnosis de las cucurbitáceas (*Glomerella lagenaria*), antracnosis del café (*Colletotrichum coffeanum*), antracnosis del frijol (*Colletotrichum lindemuthianum*), botritis del ajo y de la cebolla (*Botrytis aclada*), cenicienta del papayo (*Pucciniopsis caricae*), cenicienta polvorienta de las cucurbitáceas (*Golovinomyces cichoracearum*), cercospora del chile (*Cercospora capsici*), chahuixtle o roya del cacahuate (*Puccinia arachidis*), chahuixtle o roya del frijol (*Uromyces [Uromyces] appendiculatus*), cordana (*Cordana musae*), damping-off o costra negra (*Thanatephorus cucumeris*), derrite o requemo del café (*Phoma costaricensis*), escoba de bruja del cacao (*Crinipellis perniciosa*), fusariosis o pudrición radical (*Fusarium sp.*), gomosis de los cítricos (*Phytophthora nicotianae*), mal de hilachas (*Corticium koleroga*), mal rosado (*Erythricium salmonicolor*), mancha anular de las coles (*Mycosphaerella brassicicola*), mancha café de las hojas del cacahuate (*Mycosphaerella arachidis*), mancha de hierro del café (*Mycosphaerella coffeicola*), mancha de la hoja (*Cercospora sp.*), mancha de la hoja de la calabacita (*Corynespora cubensis*), mancha de la hoja de la col (*Alternaria brassicae*), mancha de la hoja de la zanahoria (*Cercospora carotae*), mancha de la hoja del rosál (*Mycosphaerella [Mycosphaerella] rosicola*), mancha de la hoja o mancha foliar del jitomate (*Septoria lycopersia*), mancha foliar (*Mycosphaerella sp.*), mancha foliar de las cucurbitáceas (*Corynespora cassicola*), mancha foliar del apio (*Cercospora apii*), mancha foliar del crisantemo (*Didymella ligulicola*), mancha foliar del crisantemo (*Cercospora chrysanthemi*), mancha foliar del maíz (*Setosphaeria turica*), mancha gris del jitomate (*Stemphylium solani*), mancha negra del rosál (*Diplocarpon rosae*), mancha o peca de la hoja del cacahuate (*Mycosphaerella berkeleyi*), mancha o tizón de la hoja (*Alternaria sp.*), mancha ojo de rana (*Cercospora sojina*), mancha parda (*Septoria glycines*), mancha púrpura (*Alternaria pomii*), mancha púrpura de la soya (*Cercospora kikuchii*), mildiu de la cebolla (*Peronospora destructor*), mildiu de la col y otras crucíferas (*Hyaloperonospora [Peronospora] parasitica*), mildiu de la soya (*Peronospora manshurica*), mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis*), moho blanco del narciso y otras ornamentales (*Sclerotinia sclerotiorum*), moho gris (*Botryotinia fuckeliana*), moho gris (*Botrytis sp.*), moho gris del jitomate (*Passalora [Fulvia] fulva*), moho negro del jitomate (*Alternaria alternata*), moniliasis del cacao (*Moniliophthora roreri*), oidio de la acelga (*Erysiphe betae*), oidio de las cucurbitáceas (*Sphaerotheca fuliginea*), ojo de gallo (*Mycena citricolor*), pecas del fruto (*Guignardia musae*), podredumbre gomosa de los tallos de la calabacita y otras cucurbitáceas (*Didymella bryoniae*), pudrición del fruto del papayo (*Cercospora papayae*), pudrición morena (*Monilinia fructicola*), pudrición negra del cacao o pudrición del fruto del papayo (*Phytophthora palmivora*), pudrición seca de la cebolla (*Embellisia alli*), pudriciones de cuello, tallo y fruto (*Phytophthora sp.*), quema o añublo del arroz (*Magnaporthe grisea*), quema o tizón foliar de la zanahoria (*Alternaria dauci*), roña de las cucurbitáceas (*Cladosporium cucumerinum*), roya común del maíz (*Puccinia sorghi*), roya del café (*Hemileia vastatrix*), roya del maíz (*Puccinia polysora*), roya del tallo o roya negra de los cereales (*Puccinia graminis*), sigatoka amarilla o chamusco (*Mycosphaerella musicola*), sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*), tiro de munición (*Stigmata carpophila*), tizón de la hoja del maíz (*Cochliobolus heterostrophus*), tizón de la vaina y tallo de la soya (*Diaporthe phaseolorum*), tizón foliar de las cucurbitáceas (*Alternaria cucumerina*), tizón foliar de los cereales (*Helminthosporium sp.*), tizón tardío (*Phytophthora infestans*), tizón tardío del apio (*Septoria apicola*), tizón temprano (*Alternaria [Alternaria] olani*) y verrucosis (*Taphrina deformans*) y otros muchos hongos fitopatógenos.



FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

No controla *Pythium ultimum*, la actividad contra *Septoria sp.* puede reducirse si hay un ataque fuerte de mildiu o roya; en estos casos debe mezclarse con los fungicidas apropiados. Sus formulaciones pueden ser utilizadas en algunos de los cultivos y plantaciones siguientes: ajo, apio, banano, brócoli, cacahuete, cacao, cafeto, calabacita, calabaza, cebolla, cebolla verde, cempasúchil, césped, chabacano, chile, ciruelo, clavel, col, col de bruselas, coliflor, crisantemo, durazno, frijol, frijol ejotero, geranio, haba, jitomate, maíz, mango, melón, nectarino, ornamentales, papa, papayo, pepino, plátano, rosál, sandía, soya, tomate de cáscara, zanahoria. Y sus formulaciones con propamocarb clohidrato en cultivos de calabacita, calabaza, jitomate, melón, papa, pepino; con dimetomorf en papa; con metalaxil en jitomate, papa; con metalaxil-MI en brócoli, calabaza, cebolla, col, coliflor, jitomate, melón, papa, pepino; con cymoxanil en calabacita, calabaza, jitomate, melón, papa, pepino, sandía.

Propiedades de CELESTE® 720 FW:

Apariencia: Líquido viscoso de color blanco a gris libre de grumos visibles.

Densidad a 20°C: 1.330 a 1.350 g/mL

pH en solución al 5%: 7.0 a 8.0

Suspensibilidad: Mínimo 90%.

Solubilidad en agua: 0.81 mg/L a 20°C (I.A. IUPAC)

Punto de fusión: 252.1°C (I.A. IUPAC)

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/ha)	Intervalo de seguridad	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Ajo	Mancha púrpura (<i>Alternaria pom</i>) Mohogris (<i>Botrytis allii</i>) Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>)	1.25 - 2.5	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Acelga	Mancha foliar (<i>Cercospora apii</i>)	1.5 - 3.5	7	
Apio	Tizón foliar (<i>Septoria apii</i>) Mancha foliar (<i>Cercospora apii</i>)	1.5 - 1.75	7	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Pudrición radical (<i>Rhizoctonia sp.</i>)	1.5 - 3.5		
Apio semillero	Mancha foliar (<i>Cercospora apii</i>)	1.2 - 1.75	7	Aplicación al follaje en forma preventiva.



VERSA®

FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/ha)	Intervalo de seguridad	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Berenjena	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.7-2.0	7	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Brócoli Col Col de bruselas Coliflor	Mancha foliar (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.75	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Mildiú (<i>Peronospora parasitica</i>)	2.5		
Cacahuete Garbanzo	Mancha café de la hoja (<i>Cercospora arachidicola</i>) Mancha o peca de la hoja (<i>Cercospora personata</i>) Roya (<i>Puccinia arachidis</i>)	1.5–1.75	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Cacao	Pudrición negra (<i>Phytophthora palmivora</i>) Mal de hilachas (<i>Corticium koleroga</i>)	3.0–6.0 mL/planta	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Cafeto	Mancha de hierro (<i>Cercospora coffeicola</i>) Mancha ojo de gallo (<i>Mycena citricolor</i>) Derriete o requemo (<i>Phoma costaricensis</i>) Mal de hilachas (<i>Corticium koleroga</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum coffeanum</i>) Roya del cafeto (<i>Hemileia vastatrix</i>)	200–250 mL/100 L de agua	30	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Calabacita Calabaza	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Mancha foliar (<i>Corynespora casicola</i>) Gomosis del tallo (<i>Mycosphaerella citrulina</i>) Roña (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	1.75–2.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.



VERSA®

FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/ha)	Intervalo de seguridad	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Chayote	Roña (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	2.5–3.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Cebolla	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Moho gris (<i>Botrytis allii</i>)	1.5–2.5	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Cebolla verde	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>) Moho gris (<i>Botrytis sp.</i>)	1.75–3.5	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Cempasúchil	Mancha foliar (<i>Alternaria sp.</i>)	1.5–2.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Césped	Moho gris (<i>Botrytis sp.</i>)	200–250 mL/100 m2	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Roya (<i>Puccinia graminis</i>) Mancha foliar (<i>Alternaria sp.</i>) Pudrición café (<i>Rhizoctonia solani</i>) Quemado (<i>Pyricularia grisea</i>)	125–250 mL/100 m2	SL	
	Tizón de la hoja (<i>Helminthosporium sp.</i>)	60–120 mL/100 m2		
Ciruelo	Tiro de munición (<i>Coryneum beijerinckii</i>) Pudrición morena (<i>Monilinia fruticola</i>) Verrucosis (<i>Taphrina deformans</i>)	3.5–5.0	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Chabacano Cereza	Pudrición morena (<i>Monilinia fruticola</i>) Tiro de munición (<i>Coryneum beijerinckii</i>) Verrucosis (<i>Taphrina deformans</i>)	3.5–5.0	30	Aplicación al follaje en forma preventiva.



VERSA®

FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/ha)	Intervalo de seguridad	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Chile	Mancha foliar (<i>Cercospora capsici</i>)	3.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5–3.0		
	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.5		
Durazno	Verrucosis (<i>Taphrina deformans</i>)	3.5–5.0	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Mohogris (<i>Botrytis cinerea</i>)	135-175 mL/100 L de agua		
Espárrago	Mancha foliar (<i>Septoria lycopersici</i>)	1.20-2.5	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Frijol	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	1.5–2.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Roya (<i>Uromyces appendiculatus</i>)			
	Mohogris (<i>Botrytis cinerea</i>)			
Frijol ejotero	Mohogris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5–3.5	7	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Roya (<i>Uromyces appendiculatus</i>)			
	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)			
Geranio	Mohogris (<i>Botrytis sp.</i>) Mancha negra (<i>Diplocarpon rosae</i>)	135–170 mL/100 L de agua	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.



FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/ha)	Intervalo de seguridad	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Jitomate	Tizón temprano (<i>Alternaria sp</i>) Mancha gris (<i>Stemphylium solani</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum phomoides</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Moho gris de la hoja (<i>Cladosporium fulvum</i>) Mancha de la hoja (<i>Septoria lycopersici</i>)	1.5–2.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Pudrición del fruto (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2.5–3.5		
	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.0-2.5		Deberá aplicarse al detectarse los primeros síntomas de la enfermedad, con un intervalo semanal entre cada aplicación del producto. Aplicación al follaje.
Maíz	Tizón foliar (<i>Helminthosporium sp.</i>)	0.875–2.5	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Mango	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	500 mL/100 L de agua	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Melón	Mancha anillada (<i>Corynespora cassicola</i>)	2.5–3.0	SL	Realizar una aplicación al follaje, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 193-293 L de agua/ha.
Melón Pepino	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Mancha de la hoja (<i>Cercospora sp.</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>) Gomosis del tallo (<i>Mycosphaerella citrullina</i>) Roña (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	2.5–3.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Mancha anillada (<i>Corynespora cassicola</i>)	1.75–2.5		



FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/ha)	Intervalo de seguridad	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Nectarino	Tiro de munición (<i>Clasterosporium carpophyllum</i>) Tiro de munición (<i>Coryneum beijerinckii</i>) Pudrición morena (<i>Monilinia fruticola</i>) Verrucosis (<i>Taphrina deformans</i>)	350–450 mL/100 L de agua	30	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Omamentales	Mohogris (<i>Botrytis sp.</i>)	1.25–1.7 L/100 L de agua	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Papa	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.0–2.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5–3.0		
Papayo	Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>) Pudrición radical (<i>Phytophthora sp.</i>) Pudrición floral (<i>Alternaria sp.</i>)	2.5–4.7	14	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloesporoides</i>)	2.0–3.0		Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; para asegurar un control adecuado es necesario agregar un surfactante a razón de 0.3 mL/L de agua; volumen de aplicación 800 L de agua/ha.
Plátano	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) Cordana (<i>Cordana musae</i>) Sigatoka amarilla o chamusco (<i>Mycosphaerella musicola</i>)	1.5–2.5	7	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Rosal	Mohogris (<i>Botrytis sp.</i>) Mancha negra (<i>Diplocarpon rosae</i>)	135–170 mL/100 L de agua	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.



FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS (L/ha)	Intervalo de seguridad	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Sandía	Roña (<i>Cladosporium cucumerinum</i>) Podredumbre gomosa de los tallos (<i>Mycosphaerella citrulina</i>) Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Mancha de la hoja (<i>Cercospora sp.</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)	2.5–3.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Mancha foliar (<i>Corynespora casicola</i>)	1.75–2.5		
Soya	Antracnosis (<i>Colletotrichum dematium</i>) Tizón del tallo o la vaina (<i>Diaporthe phaseolorum</i>) Mancha ojo de rana (<i>Cercospora sojina</i>) Mancha púrpura (<i>Cercospora kikuchii</i>) Mildiú (<i>Peronospora manshurica</i>)	1.5–2.5	40	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Mancha parda (<i>Septoria glycine</i>)	1.5–3.0		
Tabaco	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5–3.0	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
Tomate de cáscara	Antracnosis (<i>Colletotrichum sp.</i>)	1.5–2.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.
	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5–3.5		
Zanahoria	Tizón foliar (<i>Alternaria dauci</i>) Tizón foliar (<i>Cercospora carotae</i>)	1.75–2.5	SL	Aplicación al follaje en forma preventiva.



FICHA TÉCNICA FUNGICIDAS



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

*Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas, sin embargo para mayor seguridad del personal de trabajo espere a que seque completamente antes de ingresar a lugares tratados..

Métodos para preparar y aplicar el producto:

Antes de abrir el producto deberá colocarse su equipo de protección: mascarilla, overol, botas y guantes de neopreno, gorra y lentes protectores. Antes de la aplicación de **CELESTE® 720 FW** verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. En un tambo de 200 L agregue agua hasta la mitad de su capacidad. Vierta lentamente en el tambo la cantidad necesaria del producto, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, llene el tambo con el agua necesaria. Aplique de inmediato. Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. Para obtener mejores resultados se recomienda utilizar el volumen necesario de agua. En aplicaciones terrestres de 200 a 400 L asegúrese de obtener una buena cobertura. Para obtener una mayor calidad en la aplicación de **CELESTE® 720 FW** (cobertura, dispersión, extensión y humectación), es recomendable el uso de un coadyuvante del tipo no iónico.

Toxicología:

Categoría toxicológica: 4 – Precaución – Nocivo si se inhala

Presentaciones disponibles:

Envases de 1L, 10 L, 50 L, 200 L

Fecha de actualización: Octubre 2023

